

Till alla som vaccinerar med covid -19 vaccin

Uppdaterad information



I Sverige erbjuds för närvarande vaccination till personer från 12 års ålder med Comirnaty (Pfizer).
Från och med att personen har fyllt 31 år kan också Spikevax (Moderna) erbjudas.
För barn 5-11 år inom särskilda riskgrupper rekommenderas vaccination mot Covid-19 med Comirnaty barnformulering 10 mikrogram/dos.



Vaccinationsstatistik (18+)

per åldersgrupp

376 128	328 372	325 684	207 655	1 898
Antal invånare	Antal vaccinerade individer dos1	Antal vaccinerade individer dos2	Antal vaccinerade individer dos3	Antal vaccinerade individer dos4
87,3%	86,6%	55,2 %	0,5 %	
Andel vaccinerade individer dos1	Andel vaccinerade individer dos2	Andel vaccinerade individer dos3	Andel vaccinerade individer dos4	

Åldersgrupp	Antal invånare	Antal dos1	Andel dos1	Antal dos2	Andel dos2	Antal dos3	Andel dos3	Antal dos4	Andel dos4
18-19	10 488	8 593	81,9%	8 169	77,9%	450	4,3 %	1	0,0 %
20-29	60 712	46 178	76,1%	46 354	76,4%	10 650	17,5 %	32	0,1 %
30-39	62 412	50 760	81,3%	49 639	79,5%	18 506	29,7 %	70	0,1 %
40-49	55 440	48 008	86,6%	47 459	85,6%	26 388	47,6 %	141	0,3 %
50-59	59 032	53 205	90,1%	52 787	89,4%	38 486	65,2 %	260	0,4 %
60-64	25 627	23 817	92,9%	23 716	92,5%	20 438	79,8 %	204	0,8 %
65-69	24 584	23 100	94,0%	23 043	93,7%	21 412	87,1 %	282	1,1 %
70-74	24 457	23 219	94,9%	23 167	94,7%	22 045	90,1 %	300	1,2 %
75-79	23 253	22 386	96,3%	22 336	96,1%	21 450	92,2 %	355	1,5 %
80-84	15 166	14 672	96,7%	14 632	96,5%	14 055	92,7 %	179	1,2 %
85-89	8 945	8 648	96,7%	8 622	96,4%	8 267	92,4 %	57	0,6 %
90+	6 012	5 786	96,2%	5 760	95,8%	5 508	91,6 %	17	0,3 %



Vaccinationsstatistik (18+)

per kommun

376 128	328 372	325 684	207 655	1 898
Antal invånare	Antal vaccinerade individer dos1	Antal vaccinerade individer dos2	Antal vaccinerade individer dos3	Antal vaccinerade individer dos4
87,3%	86,6%	55,2 %	0,5 %	
Andel vaccinerade individer dos1	Andel vaccinerade individer dos2	Andel vaccinerade individer dos3	Andel vaccinerade individer dos4	

Kommun	Antal invånare	Antal dos1	Andel dos1	Antal dos2	Andel dos2	Antal dos3	Andel dos3	Antal dos4	Andel dos4
Boxholm	4 481	4 044	90,2%	4 007	89,4%	2 836	63,3 %	21	0,5 %
Finspång	17 661	15 258	86,4%	15 021	85,1%	9 204	52,1 %	88	0,5 %
Kinda	8 144	7 399	90,9%	7 303	89,7%	5 195	63,8 %	61	0,7 %
Linköping	132 864	115 387	86,8%	115 717	87,1%	69 881	52,6 %	461	0,3 %
Mjölby	22 308	20 262	90,8%	19 960	89,5%	13 018	58,4 %	90	0,4 %
Motala	35 074	31 633	90,2%	31 190	88,9%	22 158	63,2 %	259	0,7 %
Norrköping	114 555	97 789	85,4%	96 298	84,1%	59 373	51,8 %	647	0,6 %
Söderköping	11 633	10 663	91,7%	10 535	90,6%	7 417	63,8 %	91	0,8 %
Vadstena	6 329	5 838	92,2%	5 792	91,5%	4 587	72,5 %	74	1,2 %
Valdemarsvik	6 399	5 706	89,2%	5 634	88,0%	3 937	61,5 %	33	0,5 %
Ydre	3 050	2 180	71,5%	2 164	71,0%	1 660	54,4 %	19	0,6 %
Åtvidaberg	9 316	8 597	92,3%	8 487	91,1%	5 897	63,3 %	41	0,4 %
Ödeshög	4 314	3 616	83,8%	3 576	82,9%	2 492	57,8 %	13	0,3 %



Spikevax (Moderna)

- mRNA vaccin, går bra att kombinera med andra vacciner
- Ges endast till personer 31 år och äldre pga enstaka fall med myocardit och pericardit hos yngre än 30 år
- Som dos 1, dos 2 och extrados- ge 0,5 ml
- Som dos 3 och dos 4- ge 0,25 ml
- Uppdragen spruta håller 2 timmar



Comirnaty (Pfizer)

- mRNA vaccin, går bra att kombinera med alla andra vacciner
- Finns ingen åldersgräns, kan ges från 12 år
- Ges alltid i samma dos 0,3 ml
- Uppdragen spruta håller 6 timmar



Dosintervall

- Inför varje arbetspass. Uppdatera dig på gällande riktlinje. Tyvärr sker förändringar med kort framförhållning
Just nu gäller:
 - Dos 1 – **4v** – dos 2 – **3 månader** – dos 3
 - För immunosupprimerade som fått en extrados
Dos 1 – **4v** – dos 2 – **8v** – dos 3 – **3 månader** – dos 4



- **Längre dosintervall:** Nästa dos ska ges så snart det går.
- **För kort intervall än det minsta angivna intervallet.**
Ge ytterligare en dos för att få ett fullgott vaccinationssvar.
Den förtidigt givna dos 2 räknas som 1, ge en ytterligare dos som blir dos 2 med det korrekta intervallet.



Genomgången covid 19

Genomgången Covid-19: Kan vaccineras efter fullt tillfrisknande i enlighet med nationella rekommendationer. Vid osäkerhet kring symtomfrihet kan 2 veckor vara ett riktvärde för den tid som ska ha förflutit sedan symtomdebut. För dos 3 gäller att även denna kan ges så snart man tillfrisknat. Vid symtomgivande infektion med Covid-19 ger denna en viss immunitet och man kan skjuta upp intervallet till dos 3 med 2-3 månader efter individuell bedömning.

Patienter med kvarstående långvariga symptom hänvisa till behandlande läkare för bedömning



Vaccination personer under 18 år

- Under 18 år: samtycke från båda vårdnadshavarna krävs.
- Personer under 18 år rekommenderas inte en tredje dos.
- Personer 16 år och äldre där har vaccinatören legitimerad sjuksköterska delegation att ordinera.
- Personer 12-15 år Ordination endast av läkare, distriktssköterska samt de med vidareutbildning inom barn och ungdomsmedicin.
- 5-11 år: vaccination endast till riskgrupper på barnkliniken. Barnklinikerna har tillgång till speciella barndoser.



Vaccin till gravida

- Dos 1 ges efter graviditetsvecka 12 av psykologiska skäl.
- Om kvinnan har fått sin dos 1 innan hon visste att hon var gravid så ges dos 2 i vanligt intervall.
- Man har inte kunnat se någon påverkan på barnet.
- Kvinnan har ökad risk för, för tidig födsel och andra komplikationer samt svår sjukdom om man får covid -19 i sen graviditet.



Hygienregler

- Arbetskläder
- Inga ringar, klocka eller målade naglar
- Kortärmat- du måste kunna sprita dina underarmar
- Munskydd
- Sprita händerna före du tar på handskar
- Vaccinera
- Sprita när du är klar med en patient




Arbetsrutin

- Identitetskontroll. Ålder?
- Öppna MittVaccin. Kolla hälsodeklaration, tidigare vaccinationer, vaccinsort och när de givits. Räkna ut att intervallet stämmer.
- Bestäm vilket vaccin som ska ges, var lyhörd om patienten har speciella önskemål, fråga inte. Moderna över 31 år Pfizer under 31 år. Är det ett barn? Har barnet fyllt 12 år?
- Vaccinera. Ge infoblad om biverkningar och vaccinationskort.
- Dokumentera givet vaccin rätt dosnummer, batchnummer. Vid avvikelser tex läkarrådgivning dokumentera i cosmic.



Stickteknik

- Var noga då du tar ut insticksstället så att du inte sticker i bursan eller muskelfästet då detta kan orsaka skador och lidande för patienten.
- Utgå ifrån akromion, lägg din hand så att ditt pekfinger utgör övre delen på triangeln, två-tre fingerbredder nedanför akromion. Lägg din andra hand så att fingrarna pekar uppåt mot axeln, sära på pekfingret och långfingret så att de bildar ett V. Nu har du bildat en triangel med dina fingrar, injektionsstället är i mitten av triangeln.



Intramuskulär injektion i överarmen.



När det blir fel

Vad har hänt?

Gett fel dos? Gett fel vaccin? Valt fel vaccin i förhållande till ålder?

Patienten har fått en allvarlig komplikation?

Åtgärder:

Upptäcker du det direkt: Informera patienten direkt, vill du ha stöd be läkare delta vid samtalet. "Förlåt det blev fel"

Upptäcker du det efteråt: Ring upp patienten beklaga. Ge information om vad personen ska tänka på. Be om ursäkt

Det ska dokumenteras i cosmic.

Prata med din chef som skriver en avvikelse. Den hanteras i avvikelsegrupp.

Känns det svårt att hantera själv kontakta din chef så får du hjälp.

Om vi får reda på att patienten fått en allvarlig komplikation görs en utredning där berörda kan bli intervjuade



Kom ihåg vid samtal med patient eller skriftliga redogörelser

- Lyssna
- Gå inte i försvar
- Man kan beklaga utan att medge att något fel begåtts

Hittills har vaccinatörer i Östergötland utfört

901 669 Vaccinationer

Ett stort tack till er alla